

CUADRO N.1

Combinaciones de plantas en diversas modalidades de Sistemas Agroforestales

| Árboles de servicio | | SAF con café | SAF con cacao | Sistema silvopastoril | |
|----------------------------|------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|
| Especie | Nombre común | | | Cercas vivas | Cortinas rompeviento |
| Poro | <i>Erythrina poeppigiana</i> | X | X | X | |
| Madero Negro | <i>Gliricidia sepium</i> | X | X | X | |
| Grevilia | <i>Grevilia robusta</i> | X | | | |
| Guaba | <i>Inga edulis</i> | X | | | |
| Guácimo | <i>Guazuma ulmifolia</i> | | | X | |
| Indio desnudo | <i>Bursera simaruba</i> | | | X | |
| Trueno | <i>Ligustrum hucidum</i> | | | | X |
| Manzana de agua | E. jambo | | | X | X |
| Colpachi | <i>C. níveus</i> | X | | X | X |
| Árboles frutales | | | | | |
| Limón | <i>Citrus limón</i> | X | | | |
| Níspero | <i>Eriobotrya japónica</i> | X | | | |
| Mango | <i>Mangifera indica</i> | X | | | |
| Aguacate | <i>Persea americana</i> | X | | | |
| Guayaba | <i>Psidium guajaba</i> | X | X | | |
| Guanábana | <i>Annona muricata</i> | X | | | |
| Cas | <i>Psidium friedrichsthalianum</i> | X | | | |
| Limón dulce | <i>Citrus aurantifolia</i> | | | | |
| Árboles maderables | | | | | |
| Melina | <i>Gmelina arborea</i> | | X | | |
| Teca | <i>Tectona grandis</i> | | X | | |
| Cedro amargo | <i>Cedrella odorata</i> | X | X | | |
| Laurel | <i>Cordia alliodora</i> | X | X | | |
| Pilón | <i>Hieronyma alchorneoides</i> | X | X | | |
| Eucalipto | <i>Eucaliptus spp</i> | X | | | |
| Cedro rosado | <i>Acrocarpus fraxinifolium</i> | X | | | |
| Gallinazo | <i>Schizolobium parahyba</i> | X | | | |
| Roble sabana | <i>Tabebuia rosea</i> | X | X | | |
| Amarillón | <i>Terminalia amazonia</i> | X | | | |
| Botarrama | <i>Vochisia guatemalensis</i> | X | | | |

Fuente: ONF, Montagnine, F. (2015), Fonafifo.