


TAENIA SAGINATA Y TAENIA SOLIUM

Taenia saginata (gusano plano de carne de res) y *Taenia solium* (gusano plano de carne de cerdo)



FUENTES

infectada de res o de cerdo (cruda o no cocida completamente).


PERIODO DE INCUBACIÓN

Las infecciones de *T. saginata* aparecen de 10 a 14 semanas. Infecciones de *T. solium* dentro de 8 a 12 semanas.



SÍNTOMAS

Los síntomas pueden variar dependiendo del órgano o del sistema de órganos envueltos. Por ejemplo, en los músculos pueden aparecer nódulos debajo de la piel. Un individuo con una cisticercosis que envuelva el sistema nervioso central (neurocisticercosis) puede exhibir síntomas neurológicos como problemas psiquiátricos o ataques epilépticos. La muerte es común.





DURACIÓN DE LA ENFERMEDAD

Los síntomas pueden durar por muchos años de no recibir tratamiento médico.



PREVENCIÓN

- Tomar agua apta para el consumo humano.
- No coma carnes crudas o no cocidas completamente.
- Cocina todos los asados, filetes y chuletas, de carne cruda de res y de cerdo hasta una temperatura interna mínima de 63°C.
- Evite el consumir agua o hielo contaminados.
- Lave, pele o cocine las frutas crudas y vegetales antes de comérselos.
- Asegúrese lavarse las manos frecuentemente.



Fuente:



INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NÚCLEO INDUSTRIA ALIMENTARIA



Elaborado por: Cayen Tso Zapata