

Convulsiones



Instituto
Nacional de
Aprendizaje



Introducción

En este recurso encontrará información relacionada con los signos y protocolo de atención en caso de que la PAM presente convulsiones.





Convulsiones

- Son el resultado de descargas anormales de las células del cerebro (neuronas).
- Pueden tener diferentes causas:
 - Epilepsia.
 - Calor.
 - Sobredosis de drogas y alcohol.
 - Hipoglucemia.
 - Lesiones en el sistema nervioso central (traumatismo de cráneo, meningitis).



[This Photo](#) by Unknown Author is licensed under [CC BY-NC](#)

Signos

Puede estar sufriendo una convulsión la persona que:

- Cae de repente.
- Deja de responder.
- Tiene rígido el cuerpo y arquea la espalda.
- Presenta movimientos espasmódicos.
- Tiene la mirada perdida o los ojos se van hacia arriba y queda expuesta la parte blanca del globo ocular
- No traga la saliva, por lo que se puede ver que se le sale de la boca.

La persona puede alertarnos de que se puede desmayar por medio de gritos o llanto.





Acciones ante las convulsiones

- Evite introducir cualquier objeto dentro de la boca de la víctima.
- Quite los objetos que estén cercanos a la víctima para que no se lastime con ellos.
- Trate de evitar que la persona se golpee la cabeza.
- Coloque algo blando debajo de la cabeza de la víctima como una toalla enrollada.
- Si la persona vomita, colóquela de costado.

Primeros auxilios: Convulsiones



[This Photo](#) by Unknown Author is licensed under [CC BY](#)

ADAM.



Acciones ante las convulsiones

- Una vez que termine la convulsión, realice una evaluación primaria y coloque a la persona en PLS (posición lateral de seguridad).
- Llame al 9-1-1 si la persona convulsiona por más de 5 minutos, es una embarazada, es la primera vez que convulsiona, tiene diabetes, hay alguna lesión o no tiene recuperación completa luego de una convulsión de corta duración.

Pautas a seguir en una crisis de epilepsia convulsiva

1 Despejar la zona alrededor de la víctima, separando los objetos potencialmente peligrosos.	2 No meter nada en la boca de la víctima.
3 Poner a la persona en PSL, Posición Lateral de Seguridad.	4 Llamar a emergencias -Si es la primera crisis que sufre la persona. -Si la persona se hiere durante la crisis. -Si la crisis se repite. -Si la crisis dura más de 5 minutos.

www.hoptoys.es



Acciones ante las convulsiones

La convulsión es una descarga descontrolada de las neuronas, de modo que no se detiene sosteniendo a la víctima.

Evite amarrar a la persona, ni trate de fijar sus brazos o piernas, solo cuide la cabeza de los traumatismos y aléjela de los elementos peligrosos.

Evite sacar la lengua de la víctima, no introduzca algún elemento en su boca, esto puede dañarla y obstruir su vía respiratoria.